



3	مدة الإنجاز	علوم الحياة والأرض	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض	الشعبة أو المسلك

النقطة	عناصر الإجابة	السؤال
	<b>التمرين الأول (4 نقط)</b>	
0.25	تعريف الاستجابة المناعية الاستجابة المناعية رد فعل طبيعي (غير نوعي) أو مكتسب (نوعي) موجه ضد غير الذاتي.....	
0.25	الخلايا المتدخلة في الاستجابة المناعية: - مفصصات النواة - الوحيدات - البلعميات (يعتبر الجواب صحيحا في حالة ذكر واحدة منها): أصلها: نخاع العظمي (أو خلية أصل نخاعية) مكان نضجها نخاع العظمي.....	
0.25	كيفية تدخلها: بلعمة عنصر غير الذاتي (يقبل كذلك تنشيط المناعة النوعية في حالة البلعميات الكبيرة).....	
0.5	- للمفاويات T: أصلها نخاع العظمي (أو خلية أصل لمفاوية) ومكان نضجها الغدة السعترية..... كيفية تدخلها:	
0.25	- للمفاويات T4 (أو TH) تعرف وتنشط الخلايا العارضة والمفاويات T8 والمفاويات B وذلك عن طريق السيتوكينات (أو الأنترلوكينات).....	
0.25	- للمفاويات T8 تتفرق إلى لمفاويات Tc تعمل على هدم الخلايا الهدف عن طريق إفراز البيروفرين والكرانزيم.....	
0.25	- للمفاويات B أصلها نخاع العظمي (أو خلية أصل لمفاوية) ومكان نضجها نخاع العظمي.....	
0.5	كيفية تدخلها: تتفرق إلى بلزيمات مفرزة لمضادات الأجسام.....	
0.25	المواد المتدخلة في الاستجابة المناعية (ذكر 3 عوامل مما يلي): - مضادات الأجسام: إبطال مفعول مولدات المضاد (المركب المنيع) وتسهيل البلعمة. - عوامل التكملة: تكوين مركب الهجوم الغشائي الذي يقضي على الخلية الهدف (أو الانجذاب الكيميائي للبلعميات) - الوسائط الانتهائية (أو الهيستامين والبروستاغلاندين وعامل الكينين): الرفع من نفاذية جدار العروق الدموية (أو جذب الخلايا المناعية لموقع الخمج) - الأنترلوكينات (السيتوكينات): تنشيط الخلايا المناعية.	
(0.5×3) = 1.5		
	<b>التمرين الثاني (3 نقط)</b>	
0.5	مقارنة: نسبة الألياف العضلية من النوع I أكبر في عضلات عداء المارطون بالمقارنة مع عداء المسافات القصيرة، والعكس بالنسبة للألياف العضلية من النوع II.....	1
0.25	استنتاج: الألياف التي تتدخل بشكل أكبر في المسافات القصيرة هي الألياف من النوع II.....	
0.25	- شدة القوة الضعيفة يتم الاقتصار على إدماج (استعمال) الألياف من النوع I حيث تصل نسبة إدماج الألياف إلى 30%.....	2
0.25	- شدة القوة المتوسطة يتم إدماج (استعمال) الألياف من النوع I والنوع IIa حيث تصل نسبة إدماج الألياف إلى 70%.....	
0.25	- شدة القوة الكبيرة يتم إدماج (استعمال) الألياف من النوع I والنوع IIa والنوع IIb حيث تصل نسبة إدماج الألياف إلى 100%.....	
0.75	- يتطلب عداء المسافات القصيرة توفر الألياف من النوع IIb لكونها تتقلص بسرعة وفي مدة قصيرة وتعتمد في استخلاص الطاقة على الطرق السريعة اللاهوائية وطريقة التخمر وذلك بفضل أنزيم التخمر اللبني (Lactate déshydrogénase) الأكثر نشاطا في هذه الألياف.....	3
0.75	- يتطلب عداء المسافات الطويلة توفر الألياف من النوع I لكونها تتقلص ببطء وفي مدة طويلة وتعتمد في استخلاص الطاقة على الطرق البطيئة الهوائية (وجود الميتوكوندريات بوفرة) وذلك بفضل أنزيم Malate déshydrogénase الأكثر نشاطا في هذه الألياف.....	

النقطة	عناصر الإجابة	السؤال												
	التمرين الثالث (3 نقط)													
0.25	أعطي التزاوج الأول بين أنثى ذات جسم أخضر وذكر ذو جسم أصفر جيلا متجانسا بلون أخضر. إذن الحليل المسؤول عن اللون الأخضر سائد والحليل المسؤول عن اللون الأصفر متنحي. ....	1												
0.25	أعطي التزاوج العكسي جيلا غير متجانس (ذكور بجسم أصفر وإناث بجسم أخضر). عدم تحقق القانون الأول لماندل. يتعلق الأمر بمورثة مرتبطة بالصبغي الجنسي X. ....													
0.5	تفسير التزاوج الثاني الأنثى من الجيل F1 مختلفة الاقتران والمورثة مرتبطة بالجنس: نمطها الوراثي هو $X_G X_g$ الذكر بلون أصفر نمطه الوراثي هو: $X_g Y$ الآباء: $X_g Y \text{ ♂} \times X_G X_g \text{ ♀}$ الأمشاج: $\frac{1}{2} X_g \quad \frac{1}{2} Y \quad \frac{1}{2} X_G \quad \frac{1}{2} X_g$ شبكة التزاوج:	2												
0.75	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><math>\frac{1}{2} X_G</math></td> <td><math>\frac{1}{2} X_g</math></td> <td>♀</td> <td>♂</td> </tr> <tr> <td><math>\frac{1}{4} X_G X_G [G] \text{ ♀}</math></td> <td><math>\frac{1}{4} X_g X_g [g] \text{ ♀}</math></td> <td></td> <td><math>\frac{1}{2} X_g</math></td> </tr> <tr> <td><math>\frac{1}{4} X_G Y [G] \text{ ♂}</math></td> <td><math>\frac{1}{4} X_g Y [g] \text{ ♂}</math></td> <td></td> <td><math>\frac{1}{2} Y</math></td> </tr> </table> <p>تتوافق النتائج النظرية مع النتائج التجريبية. ....</p>	$\frac{1}{2} X_G$	$\frac{1}{2} X_g$	♀	♂	$\frac{1}{4} X_G X_G [G] \text{ ♀}$	$\frac{1}{4} X_g X_g [g] \text{ ♀}$		$\frac{1}{2} X_g$	$\frac{1}{4} X_G Y [G] \text{ ♂}$	$\frac{1}{4} X_g Y [g] \text{ ♂}$		$\frac{1}{2} Y$	
$\frac{1}{2} X_G$	$\frac{1}{2} X_g$	♀	♂											
$\frac{1}{4} X_G X_G [G] \text{ ♀}$	$\frac{1}{4} X_g X_g [g] \text{ ♀}$		$\frac{1}{2} X_g$											
$\frac{1}{4} X_G Y [G] \text{ ♂}$	$\frac{1}{4} X_g Y [g] \text{ ♂}$		$\frac{1}{2} Y$											
0.5	تفسير التزاوج الثالث الآباء: $X_G Y \text{ ♂} \times X_G X_g \text{ ♀}$ الأمشاج: $\frac{1}{2} X_G \quad \frac{1}{2} Y \quad \frac{1}{2} X_G \quad \frac{1}{2} X_g$ شبكة التزاوج:													
0.75	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><math>\frac{1}{2} X_G</math></td> <td><math>\frac{1}{2} X_g</math></td> <td>♀</td> <td>♂</td> </tr> <tr> <td><math>\frac{1}{4} X_G X_G [G] \text{ ♀}</math></td> <td><math>\frac{1}{4} X_G X_g [G] \text{ ♀}</math></td> <td></td> <td><math>\frac{1}{2} X_G</math></td> </tr> <tr> <td><math>\frac{1}{4} X_G Y [G] \text{ ♂}</math></td> <td><math>\frac{1}{4} X_g Y [g] \text{ ♂}</math></td> <td></td> <td><math>\frac{1}{2} Y</math></td> </tr> </table> <p>لدينا 50% إناث جسمهن أخضر و 25% ذكور جسمهم أخضر و 25% ذكور جسمهم أصفر. تتوافق النتائج النظرية مع النتائج التجريبية. ....</p>	$\frac{1}{2} X_G$	$\frac{1}{2} X_g$	♀	♂	$\frac{1}{4} X_G X_G [G] \text{ ♀}$	$\frac{1}{4} X_G X_g [G] \text{ ♀}$		$\frac{1}{2} X_G$	$\frac{1}{4} X_G Y [G] \text{ ♂}$	$\frac{1}{4} X_g Y [g] \text{ ♂}$		$\frac{1}{2} Y$	
$\frac{1}{2} X_G$	$\frac{1}{2} X_g$	♀	♂											
$\frac{1}{4} X_G X_G [G] \text{ ♀}$	$\frac{1}{4} X_G X_g [G] \text{ ♀}$		$\frac{1}{2} X_G$											
$\frac{1}{4} X_G Y [G] \text{ ♂}$	$\frac{1}{4} X_g Y [g] \text{ ♂}$		$\frac{1}{2} Y$											

التمرين الرابع (7 نقط)

0.5	مقارنة: الكريات الدموية الحمراء للشخص المصاب مشوهة بها خضاب دموي متبلور بينما يتوفر الشخص السليم على كريات دموية حمراء عادية. ....	1
0.25	استنتاج: يؤدي هذا المرض إلى تشوه الكريات الدموية الحمراء. ....	
0.25	- المرض متنحي: الأبوان $I_1$ و $I_2$ سليمان وأعطيا بنتا $II_3$ مصابة. .... - المرض غير مرتبط بالجنس: غير مرتبط بالصبغي Y لكون الأب $II_6$ سليم وأعطى ابنا $III_5$ مصابا، فلو كان مرتبطا بهذا الصبغي لكان الأب مصابا (أو لأنه يصيب الإناث). وغير مرتبط بالصبغي الجنسي X: الأب $I_1$ سليم وأعطى بنتا $II_3$ مصابة. فلو كان مرتبطا بالجنس لكان الأب مصابا، لكون المرض متنحيا والصبغي الجنسي ينقل من الأب إلى البنت. ....	2
0.5	- الفردان $II_1$ و $II_2$ سليمان يمكن أن تكون $II_2$ مختلفة الاقتران $T/t$ أو متشابهة الاقتران $T/T$ لكونها سليمة وأبواها مختلفا الاقتران. ويمكن أن يكون الفرد $I_1$ سليما متشابه الاقتران $T/T$ أو سليما ناقلا للمرض $T/t$ . ....	
0.25	- الأنثى $II_3$ مصابة نمطها الوراثي $t/t$ لكون المرض متنحيا. ....	
0.25	الأنثى $II_2$ تتوفر على الخضابين الدمويين HbA و HbC يدل هذا على أنها تتوفر على الحليلين المسؤولين عن هذين الخضابين وبالتالي فهي مختلفة الاقتران $T/t$ . ....	3
0.25	الفرد $II_1$ يتوفر فقط على الخضاب الدموي HbA وبالتالي فهو حامل فقط للحليلين المسؤولين عن الخضاب الدموي السليم إذن نمطه الوراثي هو $T/T$ . ....	
0.25	الأنثى $II_3$ تتوفر فقط على الخضاب الدموي HbC وبالتالي فهي حاملة للحليلين المسؤولين عن الخضاب الدموي غير العادي إذن نمطها الوراثي هو $t/t$ . ....	

النقطة	عناصر الإجابة	السؤال
0.5	AUG GUG CAC CUG ACU CCU GAG GAG AAG UCU GCC : ARNm Met - Val - His - Leu - Thr - Pro - Glu - Glu - Lys - Ser - Ala : HbA	4. أ
0.5	AUG GUG CAU CUG ACU CCU AAG GAG AAG UCU GCC : ARNm Met- Val- His- Leu- Thr - Pro - Lys- Glu -Lys -Ser -Ala : HbC	
0.5	سبب الإصابة بهذا المرض هو طفرة استبدال القاعدة الأزوتية C بالقاعدة الأزوتية T على مستوى الثلاثة الرامزة رقم 7 أدت إلى استبدال الحمض الأميني Glu بالحمض الأميني Lys مما أدى إلى تكون HbC (هناك طفرة أخرى على مستوى الثلاثة الرامزة 3 غير أنها طفرة صامتة).....	
0.25	أدت الطفرة على مستوى المورثة الرامزة للخضاب الدموي إلى ظهور خضاب دموي HbC (علاقة	ب
0.25	مورثة - بروتين) يتعرض هذا الخضاب للتبلور فيترتب عنه تشوه الكريات الحمراء مما يؤدي إلى المرض (علاقة بروتين- صفة)	
0.5	تردد الحليل t : $q = \sqrt{\frac{4}{100}} = 0.2$	5. أ
0.5	تردد الحليل T : $p = 1 - q = 0.8$	
0.5	تردد مختلفي الاقتران : $2pq = 2 \times 0.2 \times 0.8 = 0.32$	ب
0.5	العامل المسؤول عن تغير بنية هذه الساكنة هو الانتقاء الطبيعي التعليل: الأفراد المصابون بمرض الهموكلوبينوز C أكثر مقاومة لجرثوم البلاسموديوم وبالتالي فهم أكثر قدرة على العيش تجاه هذا الطفيلي، مما يؤدي إلى انتقال الحليل HbC بشكل تفاضلي للأجيال الموالية.	6
	التمرين الخامس (3 نقط)	
0.5	- يتموضع الكرانيت الانداساسي في شكل كتلة محدودة جغرافيا تحيط بها صخور متحولة في شكل هالة تتكون من الشيست المبقع والكورنيين (الوثيقة 1). يظهر الشكل أ من الوثيقة 2 أن الكرانيت يخترق الصخور المحيطة به.....	1
0.25	- لم تتعرض الطبقات الرسوبية التي تنتمي إلى الكمبري للتحويل لكونها ترسبت بعد تموضع الكتلة الكرانيتية.....	
0.5	يدل وجود حبيسة الغنايس أن الصهارة التي أعطت هذا الكرانيت قادمة من العمق الذي تكون فيه الكرانيت الأناكتني بمحاذاة صخور الغنايس. انفصلت، هذه الصهارة، في شكل كتلة صعدت نحو الأعلى فأعطت الكرانيت الانداساسي.	2
0.25	- يستقر معدن البيوتيت في درجة حرارة أكبر من 400°C.....	3
0.25	- يستقر الكوردبيريت بين درجة حرارة بين 510°C و 580°C.....	
0.25	- يستقر معدن الأندلوسيت بين درجة حرارة 450°C ودرجة 650°C.....	
0.25	- يستقر معدن السيليمائيت في درجة حرارة أكبر من 650°C؛..... (يمكن قبول أي قيم قريبة من القيم المذكورة أعلاه)	
0.25	استنتاج: تشير هذه المعادن أن درجة حرارة استقرار الصخور المكونة لهالة التحويل ترتفع تدريجيا كلما اقتربنا من الكتلة الكرانيتية.....	
0.5	تتكون عند صعود الصهارة الكرانيتية كتل اندساسية تتبرد وتتصلب قبل الوصول إلى السطح فتتعرض الصخور المحيطة بها إلى ارتفاع في درجة الحرارة فتنشكّل معادن جديدة مؤشرة على هذه الظروف مكونة صخور تحول التماس.	4